第2 類医薬品
ロート
ユク
・ ・
i ゛
W
1･
仕事で
よ
ミ
111
1
すぎ ・・・
々44卜･を¥t¥をQ141 S44
ご:
心
目白ミ
⑥
…
li,.
一一一
ｒ　　 ＝　　　　　　 ㎜
〈販売名 〉ユクリズム
■　
■
XQ, 〃
一一
皿
●　 ｜
W
ｲﾗｲﾗ …
くよくよ…
錠剤ﾀｲﾌﾟ３ ６ 錠
３日分
(15 才以上)
加味帰牌湯
⑧ かみきひとう
■　 ・
;|
ｓ ‘ ．
疲れやストレスがたまって不調な方に。
気持ちをしずめてぐっすり眠れ、弱った胃腸へも
働きかけて、心と体の調子を回復します。
【効能・効果】体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪＜、
ときに熱感を伴うものの次の諸症:貧血、不眠症、精神不安、神経症

パウチでエコ
一一一一切り取り線一一一一一一一一一一一一
４ 987241
- 一一一一一一一
吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること
∠K 使用上の注意
149711
一一一一一 - -
漢方製剤
一一一一一一一
36 錠
その場合は直ちに医師の診療を受けること。
汝
幽相談すること
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 今までに薬などにより発疹･発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、
この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
1･・-i.S 当11濤g 咀i･･11 －ノ
- －-　　　　 ’-　 ． 、　　　　　
泌ｇａ_
．．_ －｡____ ＿ ＿ ．　　　　　　 ．　　　　
。
皮　ふ発疹･発赤､かゆみ
● まれ|こ下記の重篤な症状が起こることがあるＯ
症状の名称　　 ０　　　　　　　　　　　　　　　　 症　状
■ Ｓ画 i図ﾓ脳lll冠il a!i- ㎜ Ξ 槽Ξli･ilSliil- ● ●圃il 屯S!-SIBgili･ 菩●曼!閥 - ｌｌｇ皿匹四 ●-
3｡1 ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販
売者に相談すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
’
4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
【用法・用量】次の量を1 日３回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。※食間とは、食後2 ～3 時間を指す、
皿皿凛皿
成人(15 才以上)
j皿I 回Ｆ ㎜
４錠
7 才以上15 才未満 3錠
5 才以上ﾌ才未満 2錠
5才未満服用しないこと
＜用法･用量に関連する注意＞
(1) 用法･用量を厳守すること。
(2) 小児に服用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに服用させること。
【成分・分量 】12錠中　 加味帰屏湯エキス(1/2 量)2800mg にンジン1.5g 、ビャクジュツ
1.5g ヽブクリョウ1,5g ヽタイソウ0.75g ヽサイコ1.5g ヽオウギ1.0g ヽトウキ1.0g ヽサンシシ
1.0g ヽオンジ0.75g ヽカンゾウ0.5g ヽモッコウ0.5g ヽショウキョウ0.25g ヽサンソウニン1.5g ヽ
リュウガンニク1.5g より抽出)を含む。添加物としてヽステアリン酸Mg ヽＣＭＣ-Ca ヽ二酸化
ケイ素、セルロースを含む。※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いているため、錠剤の色が
多少異なることがあるｏ
【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して
保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えない
こと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 湿気により、変色など品質に影響を与える
場合があるので、ぬれた手で触れないことｏ(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。
使用
期限
製造
番号
ココロート ●pir,k ゛
:
｢ココロートパーク｣に、
あなたの貴重なご意見を
お届けください。
ｈ
叫‥
次ｍｈＲ ㈲／ Ｗ１１
14971118 Ｂ
副作用被害救済制度の問合せ先
発七冗元:ロート製薬株式会
:0120-149-931
社
大阪市生野区巽西1 -8-1
お客さま安心サポートデスク:０６-６７５８-１２３０
受付時間9:00 ～18:00(土、日、祝日を除く)
製造販売元:Ｑ大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574 番地
ｊ
日
L 」
!砧･